



UNSERE TIPPS ZUM ORALSEX OHNE GUMMI

BLOW JOB OHNE KONDOM IST NICHT OHNE RISIKO

Beim Oralsex ohne Kondom riskierst du, dich mit **mehreren sexuell übertragbaren Infektionen anzustecken** (Chlamydien, Gonorrhö, Hepatitis B, HPV, Herpes).

1# Vermeide es, kurz vor oder nach dem Blowjob, die Zähne zu putzen und Mundspülungen zu machen.



Wenn du dir unmittelbar vor oder nach dem Oralsex die Zähne putzt oder den Mund spülst, können Mikroverletzungen entstehen, durch die Infektionen leichter durchdringen können.

Du kannst deinen Mund bei Bedarf mit Wasser ausspülen und etwa drei Stunden warten, bevor du dir die Zähne putzt.

2# Vermeide es, Sperma in den Mund zu bekommen.



Das Risiko, dich mit sexuell übertragbaren Infektionen anzustecken, ist erhöht, wenn du Sperma in den Mund bekommst und vor allem, wenn du es schluckst.

3# Vermeide es, ohne Kondom einen Deep Throat anzubieten.



Der Rachen ist eine empfindliche Schleimhaut und anfällig für Infektionen.

Einen ungeschützten Deep Throat abzulehnen bedeutet auch, deinen Kunden daran zu erinnern, dass Fellatio mit Schutz noch besser sein könnte...

4# Lass dich alle 6 Monate testen.



Wenn du Oralsex praktizierst, solltest du daran denken, **alle sechs Monate zum Screening zu gehen**. Wenn dein Hals gereizt ist, schmerzt, rot oder geschwollen ist. **Gehe zum Arzt!**



Kondylome (durch HPV verursachte Wucherungen) können auch im Hals entstehen!